

ทำความรู้จักยุงร้าย

พาหะนำโรค

ยุงลาย



เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก, ไข้ช้ำ

ยุงรำคาญ



เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้าง

ยุงก้นปล่อง



พาหะนำเชื้อไข้มาลาเรีย

ยุงเสือ/ยุงลายเสือ



เป็นพาหะนำโรคเท้าช้าง



ป้องกันโรคจากยุงได้อย่างไร?

- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
- ระบายน้ำไม่ให้คั่งน้ำขัง เพื่อลดประชากรยุง
- ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีประสิทธิภาพการไล่ยุงได้ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง

ประเทศไทยเราจะสามารถพบเจอยุงที่เข้ามากัดกินเลือดของเราเป็นอาหารและเป็นพาหะนำโรคหลักๆ ได้อยู่สี่สายพันธุ์ ได้แก่ ยุงลาย ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง และยุงเสือหรือยุงลายเสือ โดยยุงแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันดังนี้



- ยุงลาย** เป็นยุงที่พบได้บ่อยในบ้านเรือนทั่วไป เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก รวมไปถึงไข้ช้ำ มีลำตัว ส่วนหัว และส่วนอกเป็นเกล็ดสีดำสลับขาว ปากมีลักษณะยาว มักออกหากินตอนกลางวัน ชอบวางไข่บนน้ำนิ่ง และตามแหล่งที่มีน้ำขังต่างๆ โดยยุงลายแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน



- ยุงรำคาญ** เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้าง มีลำตัวเป็นสีน้ำตาล ปีกใส มักอาศัยและเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำสกปรก หรือแหล่งน้ำที่เน่าเสียต่างๆ ยุงรำคาญจะวางไข่บนผิวน้ำในลักษณะติดกันเป็นแพ และชอบกัดสัตว์ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าง วัว ควาย มากกว่ากัดคน




- ยุงก้นปล่อง** คือยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรีย มีลำตัวเป็นสีน้ำตาล ปีกมีเกล็ดสี พบมากในพื้นที่ป่า มักออกหากินตั้งแต่เวลาหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไป โดยยุงก้นปล่องแบ่งออกเป็นชนิดที่เป็นพาหะหลัก ได้แก่ ชนิดไครัส ชนิดมินิมัส ชนิดแมคคูลาตัส และชนิดที่เป็นพาหะรอง ได้แก่ ชนิดซันโดคัส ชนิดโคโนตัสและชนิดซูโดวิโมไร



- ยุงเสือ หรือยุงลายเสือ** เป็นพาหะนำโรคเท้าช้าง มีลักษณะที่แปลกตาและแตกต่างจากยุงชนิดอื่นๆ คือบนลำตัวจะมีลวดลายสีเข้ม ดูสวยงาม บางชนิดมีลวดคล้ายลายเสือ ปีกมีเกล็ดหยาบ มักเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำที่มีวัชพืชน้ำขึ้น เช่น หนอง บึง และวางไข่ใต้ผิวน้ำติดตามวัชพืชน้ำต่างๆ มักออกหากินในเวลากลางคืน กัดและกินทั้งเลือดของคนและสัตว์



วงจรชีวิตยุง Mosquito Life Cycle





1 ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด

2 เปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุก 7 วัน

3 นอนกางมุ้ง

สารพัดเคล็ดลับรับมือกับยุงลาย

4 อย่าให้ยุงกัด
สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
ใช้โลชั่นทาป้องกันยุง
จุกยากันยุง
ฉีดสเปรย์กำจัดยุง

5 คว่ำภาชนะและสิ่งของที่มีน้ำขัง

6 ปลอ่ยปลาหางนกยูงในอ่างบัว

7 ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

8 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณบ้าน

9 ปฏิบัติทุกข้ออย่างสม่ำเสมอ

ไข้เลือดออก

อันตรายถึงชีวิต...แต่ป้องกันได้

ไข้เลือดออกในเด็ก

ระยะ อาการ และการรักษา

ยุงลาย

เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในเด็ก

อาการของไข้เลือดออก

ไข้ขึ้นสูงหลายวัน

ปวดศีรษะ

ปวดกระบอกตา

ปวดกล้ามเนื้อ

ท้องอืด

มีผื่นแดงขึ้น

ระยะของโรคไข้เลือดออก

ระยะไข้

- ไข้สูง 39-40 °C เกิน 4-5 วัน
- ปวดหัว ปวดกระบอกตา เบื่ออาหาร ท้องอืด เมื่อยตัว ใบหน้าแดง

ระยะวิกฤต

- ไข้ลดลง ฝ่ามือ ฝ่าเท้าเย็น
- ปัสสาวะน้อย มีอาการท้องอืด
- ระยะนี้อาจจะเกิดอาการช็อกได้

ระยะฟื้นตัว

- ฟื้นตัวเร็ว ปัสสาวะบ่อยขึ้น
- ปวดหัวลดลง อยากรับประทานอาหาร
- หากป่วยเกิดอาการช็อกแล้วรักษาอย่างทันท่วงที จะกลับมาเป็นปกติภายใน 2-3 วัน

การรักษาโรคไข้เลือดออก

งดยาแอสไพริน ยากันชัก

ดื่มน้ำผลไม้ หรือกีเลอแร้

ดูแลอย่างใกล้ชิด

วิธีป้องกัน

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สวมใส่เสื้อแขนยาวขายาว

ทายาป้องกันยุง



ยุทธวิธีกำจัดยุงลาย
ป้องกันภัย 'ไข้เลือดออก'

ไข้เลือดออก

ภัยร้ายจาก **ยุงลาย**

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๔๒-๓๑๕๘๓๐-๑